



Oplægning af optøet æg (blastocyst) "Frysecyklus"

Nedfrosne befrugtede æg ("blastocyster") kan optøs og oplægges i livmoderen.

Almindeligvis vil vi tilstræbe, at der er én blastocyst til oplægning.

Hvis du har været gravid, skal du være færdig med at amme og dine menstruationer skal igen være regelmæssige.

OBS: Ovitrelle® ("ægløsningssprøjten") skal opbevares i køleskab

Kvinder med regelmæssig menstruations-cyklus på højst 35 dage

Ring når menstruationen starter og aftal tid til ultralydsscanning på ca. 10.-12. cyklusdag.

Ved scanningen ses livmoderslimhindens tykkelse og månedens æg-blære måles.

Når skanningen viser, at ægblæren er klar til ægløsning aftales den videre plan.

- Ægløsningssprøjte: Ovitrelle® 250 mikrogram i pen. Tages om aftenen klokken ca. 22 på den aftalte dag.
- Embryoner frosset som blastocyster tøs 6 dage efter ægløsningssprøjten.
- Vi har aftalt med dig, hvornår du skal komme til oplægning. Blastocyster tøs og oplægges samme dag. Du skal komme med *let fyldt* urinblære til oplægningen.
- På embryo-oplægningsdagen skal du om eftermiddagen hjemme tage 100 mikrogram hCG. Det gør du ved at tage "10 klik" fra en Ovitrelle® pen.
- På embryo-oplægningsdagen starter du også på at tage progesteron i skeden. Det kan være Cyclogest® eller Lutinus® (3 gange daglig) eller Crinone® (2 gange daglig).
- Blodprøve for graviditet tages her i klinikken 17 dage efter ægløsningssprøjten.

Kvinder "uden" cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage)

Du starter på 2. eller 3. dagen med Østradiol eller Progynon® (se bagsiden)

- Efter ca. 10-12 dage bliver du ultralydsskannet. Når slimhinden er tyk nok påbegyndes behandling med progesteron i skeden (Cyclogest®, Lutinus® eller Crinone®). Du skal fortsat også tage østradiol. De fleste får også progesteron (Cyclogest®) til at tage i endetarmen.
- Blastocyster tøs og oplægges 6 dage efter at du er startet på Cyclogest®/Lutinus®/Crinone®.
- Vi har aftalt med dig, hvornår du skal komme til oplægning. Blastocyster tøs og oplægges samme dag. Du skal komme med *let fyldt* urinblære til oplægningen.
- Hvis du bliver *gravid*, skal du *fortsætte* behandlingen med østradiol og progesteron til du er i 10. uger gravid.
- Hvis graviditetsprøven er *negativ*, kan du slutte med østradiol og progesteron. Så får du menstruation få dage senere.

På den dag hvor vi tør og oplægger blastocysten bedes du ringe til laboratoriet for at høre, hvordan blastocysten har klaret optøningen.

Ring dato: _____

På telefon-nummer: 3940 5252

På hverdage: Ring klokken 11

På weekend+helligdage: Ring klokken 10

Frysecyklus med hormonbehandling
 Oplægning af optøede embryoner i cyklus styret med østradiol og progesteron.
 Anvendes til kvinder "uden" cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage).

